

醫

燈

續

焰

醫燈續焰卷八

錢塘後學潘楫碩甫註

同邑社盟王佑賢聖翼評

門人 李 玘臣

徐鳴鶴子和

眩暈脉證第六十一

諸風眩暈。有火有痰。左澁死血。右大虛看。

眩者。目乍黑乍明。眈眈不定也。暈者。頭昏冒旋轉。

起云治病必
求其本本者
也茲據症
因精悉無

岑岑欲倒也。高巔而見動象。風性爲然。故眩暈者。

多屬諸風。

或兼見惡風項強等證。脈應浮。宜芎藭散。東垣羌活湯之類。

又不獨

一風也。有因于火者。有因于痰者。有因于死血者。

有因于虛者。夫火性上炎。衝于巔頂。動搖旋轉。不

言可知。

或兼見心煩口燥面赤耳鳴嘈雜吞酸等證。脈應數。宜涼膈散。防風通聖散之類。

胸中痰濁。隨氣上升。頭目位高而空明。清陽所注。

滑濁之氣。擾亂其間。欲其不眩不暈。不可得矣。

或兼

見吐痰嘔飲胸否膈鳴等證。脈應滑。宜東垣諸陽上

垣半夏白朮天麻湯。滾痰丸。玉液湯之類。

行于頭。諸脉上注于目。血死。則脉凝泣。脉凝泣。則

上注之力薄矣。薄則上虛而眩暈生焉。其脉左手

必澁。澁爲滯澁。徵死血之不流利也。或兼見脇痛喜忘目黃便

黑等證宜四物湯丹又爲枯澁。徵血液之不足。皮紅花桃仁之類

也。謂之血虛。眩暈亦可。宜四物湯脉必微于左者。以左

心主血。肝藏血。腎主液爲血之源耳。頭以法天。

陽之首。又云清陽出上竅。而目在其中。清陽者。氣

也。氣不足。則不能上達。以致頭目空虛。而眩暈時

白眩暈
頭目之病
中不用其
者恐留中
不止也

時作矣。其脉右手必大而無力。散漫空鬆之象也。

謂之氣虛眩暈亦可。脉必微于右者。以右肺主氣。

脾生氣。命門火為氣之根耳。

宜補中益氣湯
芎歸菊花之類

附方

芎藭散 治風頭旋。眼目昏痛眩暈。倦怠心忪。

芎藭

前胡

白殭蚕

炒

人參

各一兩

蔓荊子

天麻

酒浸焙

防風

去叉各半兩

右爲末。每服二錢。食後溫酒調下。

東垣羌活湯 治風熱壅盛。上攻頭目昏眩。

羌活

防風

黃芩

酒洗各一兩

柴胡

七錢

黃連

酒煮一兩

黃檗

酒炒

瓜蒌

酒洗各半兩

甘草

炙七錢

白茯苓

五錢

澤瀉

三錢

右爲麤末。每服五錢。水煎取清。食後或先卧。通

口熱服之。日二服。

涼膈散

見第十九

防風通聖散

見第四十九

右散賈同知崔宜武劉庭瑞及河間者共四方
其中藥品增減分量多寡俱不相同但河間適
中選用當從之也。

半夏白朮天麻湯

見第二十二

滾痰丸

見第十七

玉液湯

治七情所傷。氣鬱生涎。隨氣上逆。頭目

眩暈。心嘈忪悸。眉稜骨痛。

半夏

肥大者六錢湯泡七次切作片

右作一服。水一鍾半。生薑十片。煎至八分。去滓入沉香末少許。不拘時溫服。

四物湯

見第二十一

補中益氣湯

見第三十九

頭痛脉證第六十二

頭痛多弦。浮風緊寒。熱洪濕細。緩滑厥痰。氣虛弦戛。

血虛微瀉。腎厥弦堅。真痛短澁。

弦為陰脉。欽直而無抑揚之勢。乃陽虛不能張大。

或致外邪所乘。况頭乃六陽所聚。邪束于外。陽鬱

於中。安得不痛。故頭痛者多弦。多弦者。不皆弦也。

亦有脉浮而痛者。屬風。風性飄蕩。虛浮也。兼見惡

自汗等證。宜仲景桂枝湯玄珠茶調散之類。脉緊而痛者屬寒。寒性收

飲緊實也。兼見惡寒發熱無汗體痛等證。宜仲景麻黃湯九味羌活湯之類。脉洪

而痛者屬熱。熱性充瀰。洪大也。兼見惡熱面赤口乾等證。其痛刺動。

山四氣真
合脉妙絕
如不獨此
為然

不定宜渴青丸二仙散對脉細而痛者屬濕。濕性

金散神等丸涼屬散之類。滲衍濡細也。兼見體痛頭重胃鼻塞月黃等證宜

豆散或紅奇効芎朮湯半夏白朮天麻湯或瓜

蒂散或紅脉緩滑而痛者屬痰。痰乃凝水結液。停

蓄不流。故替替然緩滑也。兼見嘔逆痞悶腸鳴等

白朮天麻湯之類脉弦奕而痛者屬氣虛。氣虛則弦飲奕

弱而無鼓動之力。兼見惡寒痛而空暈四肢多寒

益氣湯六君子湯之類脉微瀦而痛者屬血虛。血虛則微弱

經云手三
 陽之脈受風
 伏而不
 清為厥頭
 以手三陽
 之脈不入連
 之脈也若太
 入絡腦

蓋宜四物湯
 逍遙散之類
 脉弦堅而痛者屬腎。腎氣厥逆。不能

接引膀胱。膀胱經氣壅遏。上實下虛。顛為之痛。脉

亦弦直而堅實也。即靈樞經脉篇。所云膀胱是動。

則病衝頭痛。難經六十難。所云厥頭痛者是也。兼見

頭重暈。腰痛。少腹裏急。上熱下寒等。證宜六味丸。八味丸。羌活川芎之類。難經單言手

三陽而不及足三陽。恐未盡善。素問五藏生成篇

云。頭痛顛疾。下虛上實。過在足少陰巨陽。甚則入

腎。此正指膀胱厥痛不已。甚則入腎而為真頭痛。

也。其痛連腦盡痛。齒亦痛。蓋腎主骨。主髓。髓以腦
爲海。而齒則骨之餘也。其脉短濇者。短則陽脫于
上。濇則陰衰于下。若手足厥寒至節者。必死不治。

此等證若欲治之。非猛進烏附之藥。不可。或灸百會穴。以望生于萬一。雖然。頭痛又

不止。此數種。六府之清陽固上升。而五藏之精華

亦上注。外有六淫之侵。內有經絡之逆。使隧道壅

遏。清陽混淆。而痛作于頭巔者多矣。故五藏六府

皆能病此。但宜細察其脉。與兼見之證。以別其藏

府陰陽。寒熱虛實而施治焉。則萬舉萬當矣。

附方

桂枝湯

見第十九

玄珠茶調散

見第二十二

麻黃湯

見第十六

九味羌活湯

見第十六

瀉青丸

見第四十九

二仙散卽茶調散

大黃

黃芩 各二兩

牽牛

滑石

各四兩

右爲細末。滴水爲丸。如小豆大。溫水下十五丸。
每服加十丸。以利爲度。日三服。

對金散 治偏正頭風

大黃

黃芩

各等分

右二味爲極細末。每服四分。臨睡用好酒調下。
仍飲酒盡量一醉。散髮露頂卧。令人扇頭數百。

扇蓋煖。睡至明日病失矣。不愈再一服如前法。
須大醉扇透百發百中。

神芎丸

見第十七

涼膈散

見第十九

奇効芎朮湯

治濕頭痛。眩暈痛極。

川芎

附

生去
皮臍

白朮

已上各
三錢

桂心

法
皮

右作一服。水二鍾生薑七片。棗二枚煎至一鍾。

食遠服。

半夏白朮天麻湯

見第二十二

瓜蒂散

見第四十八

頭重紅荳散

麻黃根

炒半錢

苦丁香

半錢

紅荳

十粒

羌活

連翹

各三錢

右五味爲細末。鼻內搐之。

和劑玉壺丸

治風痰吐逆頭痛目眩胸膈煩滿。

飲食不下。及咳嗽痰盛。嘔吐涎沫。

天南星

生

半夏

生各一兩

天麻

半兩

頭白麴

三兩

右爲細末。滴水爲丸。如梧桐子大。每服二十九。
用水一大盞。先煎令沸。下藥煮五七沸。候藥浮。
卽熟。漉出放溫。別用生薑湯下。不計時候服。

補中益氣湯

見第三十九

六君子湯

見第十六

四物湯 見第二十一

逍遙散 見第五十一

六味丸 見第十六

八味丸 見第十六

心腹痛脉證第六十三

心腹之痛其類有九。細遲從吉。浮大延久。

心腹之痛其類甚多。此僅言有九者。亦舉其要耳。

曰飲。曰食。曰風。曰寒。曰熱。曰悸。曰虫。曰忤。曰瘕。飲

邪上兼見之
痼疾無遺情

者。痰飲也。痰飲。胸中。清陽滑濁。故痛。兼見氣喘否

滑宜二陳湯丹溪海蛤丸前胡半夏湯之類食者。食物也。食物停積。氣

礙不行。故痛。或勉食寒涼。餒敗之物。擾亂中和。亦

痛。兼見脹滿嘔噎食臭惡食等證其脉緊風者。風

邪也。乘虛內干。邪正相搏。故痛。兼見自汗惡風等

散參蘇飲之類寒者。寒邪也。乘虛內襲。榮脉凝泣。故痛。兼

惡寒嘔逆喜溫等證其脉緊熱者。火也。火鬱不發。

五積散蘇合香丸之類薰蒸于中。故痛。兼見惡熱中嘈雜吞酸等證其脉數宜統旨清中湯越鞠丸佐金

九之類悸者。心中動悸也。中氣空虛。乍有所觸。不能

持定。故痛。兼見心驚心悸恍惚等證其脉虛微痛而欲按宜黃耆建中湯補中益氣湯六

君子湯之類。虫者。虫積也。飲食不節。寒熱不時。以致虫

動。虫動。則攻衝上下。故痛。兼見面黃白班駁嘔吐清水沃沫或作或止或

痛處動欲食等證其脉大小不勻宜九痛丸剪紅丸蕪荑散仲景烏梅圓萬應丸集効丸之類忤

者。客忤也。不正之邪。一時干忤。亂其清道。撓其運

機。故痛。兼見吐逆頭目不清或妄見妄言或不知人等證其脉數動宜蕪荑合丸備急丸紫金

錠九痛症者。尸症也。如蠱如蛭。不識何因。或去或

此症用瓦礫
一味煨為
末湯服其妙

來。痛無定所。此得之亾人所傳。卽傳尸氣也。

兼見骨蒸

吐血。欬嗽。勞損。諸證。其脉微弱。而數。宜于勞病門選方對證用之。

外有瘀血痛。厥

心痛。真心痛三種。瘀血痛者。痛在胃脘。或熱飲食。

或極嘔吐。致傷胃脘。絡血迸溢。瘀留于中。氣爲所

礙。或作或止。或食下痛甚。或飲湯水作呃。其脉瀹。

宜二陳湯。桃仁。紅花。五靈脂。玄胡。香附。韭汁。藕汁。紅曲之類。

厥心痛者。因諸藏

府經絡。有循胃口上膈者。

手太陰肺

有絡肺下膈者。

手陽

明大腸

有下膈屬胃絡脾者。

足陽明胃

有從胃別上膈注

心中者。

足太陽陰脾

有絡心下膈抵胃者。

手太陽小腸

有夾脊

者。

足太陽膀胱

有絡心注胸中者。

足少陰腎

有起于胸中出

屬心包絡下膈者。

手厥陰心包絡

有布膻中散絡心包下

膈者。

手少陽少焦

有下胸中貫膈者。

足少陽膽

有夾胃上貫

膈布脇肋者。

足厥陰肝

有循腹裏上關元者。

奇經任脈

有並

於脊裏者。

奇經督脈

有夾臍上行至胸中而散者。

奇經衝脈

有入裏維絡諸陰者。

奇經陰維脈

是諸藏府經絡及任

督衝維之脈氣有厥逆則經有偏盛而當脈所過

如胃口。胸。膈。心。包。膈。中。脊。脇。臍。腹。等處。隨經相引

而痛。乃諸經之痛。豈心痛哉。

諸經之痛。則隨經有兼見之證。如肺經痛。

惡寒。氣急。脹滿。痛引缺盆。宜參蘇飲。香蘇散。蘇合

丸之類。大腸痛。上引膈。腸鳴。口乾。宜四七湯。枳桔

二陳湯之類。胃痛。引脾。及膈。乳。嘔吐。宜二陳湯。平

胃散。東垣溫胃湯。來復丹之類。脾痛。引胃脘。心下。

腹脹。善噫。善嘔。食不下。宜二陳湯。香砂平胃散。理

中湯。來復丹之類。小腸痛。引臍。胃。腸鳴。宜二陳湯。

四七湯。蘇合丸之類。膀胱痛。引腰脊。惡寒。宜參蘇

飲。東垣天台烏藥散。腎痛。引胸中。腰脊。心如饑。上

氣。喝喝而喘。善恐。宜牛膝丸。烏藥順氣散之類。心

包痛。引包絡。胸脇。胸脇支滿。心動。心煩。喜笑。宜二

陳湯。鐵逆先生交感丹之類。三焦痛。引心包。腹中。

耳鳴。宜二陳湯。越雲丸之類。膝痛。引胸脇。脇肋。已

真氣
虛火
為真

苦善太息。振寒。宜二陳湯。溫膽湯。小柴胡湯之類。
肝痛。引脇。胃肺肋。豎乾。嘔逆。胸滿。宜二陳湯。四七
湯。來復。真心痛者。真藏痛也。蓋心為一身君主。神
明所居。邪不易侵。病不易及。必也真藏自虛。神明
失守。致心包厥痛之邪。乘虛而入。難經言其痛甚。
但在心。但在心。則毫不控引他處。必兼見神昏舌
短。手足青冷。斯為旦發夕死。夕發旦死之真心痛
耳。已上諸痛。若脉見細遲。是氣減舒徐。厥邪衰退
之象。理應從吉。設或大浮。知邪方盛。況心腹裏證。

而得表脉。更非所宜。雖不至于殞軀。亦難愈也。

附方

二陳湯

見第十六

丹溪海蛤丸 治痰飲心痛

海蛤

燒爲灰研極細過
數日火毒散用之

瓜蒌仁

帶殼同研

右以海蛤入瓜蒌內。乾濕得所爲丸。每服五十丸。

前胡半夏湯

治痰症

前胡

半夏

製薑

茯苓

各二錢

陳皮

木香

紫蘇

枳殼

甘草

各一錢

右作一服。水二鍾。生薑三片。烏梅一個。煎一鍾。食遠服。

正傳加味枳木丸

治痰積。食積。酒積。果積。食積。

肉積。在胃脘當心而痛。及痞滿惡心。嘈雜噯氣。

吞酸吐嘔。脾疼等證。

白朮 三兩

枳實 炒 黃色

蒼朮 米泔浸 三宿焙

猪苓 去黑皮

麥蘗麴 炒 微黃

半夏 湯泡透 各一兩

澤瀉 去毛

赤茯苓 去皮

川芎

黃連 陳壁土炒去土

白螺殼 煨 各七錢

縮砂仁

草豆蔻

黃芩 陳壁土同炒

青皮 去白

萊菔子 炒

乾生薑 各七錢

陳皮 去白

香附米 童便浸

神麴 炒 微黃

瓜蒌仁

厚朴 薑製炒

檳榔 各三錢

木香

其艸各二錢

吞酸。加吳茱萸湯泡。寒月五錢。熱月二錢半。久病挾虛。加入參。白扁豆。石蓮肉。各五錢。時常口吐清水。加炒滑石一兩。牡蠣五錢。

右爲細末。用青荷葉泡湯浸晚粳米。研粉作糊爲丸。如桐子大。每服七十丸。多至百丸。清米飲送下。

香砂平胃散 見第四十四

香蘇散

見第四十八

參蘇飲

見第四十七

五積散

見第三十七

蘇合香丸

見第十八

統旨清中湯 治火痛

黃連

山梔

炒各二錢

陳皮

茯苓

各一錢半

半夏

一錢薑湯炮七次

草豈寇仁

槌碎

甘草

炙各七分

水二鍾。薑三片。煎八分。食前服。

越鞠丸

見第四十一

左金丸

見第四十九

黃耆建中湯

見第二十一

補中益氣湯

見第三十九

六君子湯

見第十六

金匱九痛丸

治九種心痛

附子

炮二兩

生狼牙

炙香

巴豆

去皮心炒研如脂各

醫燈續焰

卷八

十五

陸地舟

半兩

人參

乾薑

吳茱萸

各一兩

右爲末。煉蜜丸如桐子大。酒下。強人初服三丸。日三服。弱者二丸。兼治卒中惡。腹脹。口不能言。又治連年積冷。流注心胸痛。併冷腫上氣。落馬墜車血疾等證。皆主之。忌口如常法。

神効剪紅丸 專取一切虫積。神効無比。凡人百病。皆人飲酒過度。食傷生冷。致使脾胃不和。心

膈脹滿。嘔惡咽酸。常吐清水。面色痿黃。不進飲食。山嵐瘴氣。水腫蟲脹。胸脇欬嗽。痰涎壅滯。酒積。食積。氣積。氣塊。翻胃。噎膈。嘔逆。惡心。腸風痔漏。藏毒酒痢。累蘊積熱。上攻頭目。下生瘡癰。婦人血氣。寒熱往來。肌體羸弱。月經不調。赤白帶下。鬼氣鬼胎。產後諸疾。小兒五疳虫積。誤吞銅鐵。惡食惡毒等物。並宜服之。每服五更雞鳴時。用冷茶清吞下。更用馬桶盛糞于野地看之。庶

見藥易辨。或虫或積。或如魚凍。或作五色等積。若一次未見虫積。更看第二三次下來。此卽是病根。有積消積。有氣消氣。有虫取虫。有塊消塊。若病根去。其病自消。若病淺。卽一服見効。若源深。更須再一服。能宜導四時蘊積。春宜積滯。不生瘡毒。夏宜暑濕。不生熱痢。秋宜痰飲。不生瘰癧。冬宜風寒。不生瘟疫。此藥溫和。不動元陽真氣。亦無反惡。小兒半服。孕婦休服。其效如神。

一上末 檳榔生研細。取淨末一斤。以二兩爲母。餘十四兩。上第一次。以一等羅篩過。取齊晒乾。

二上末 商陸。卽樟柳根。白者可用。赤者殺人。金毛狗脊。貫衆。各四兩。已上三味。和一處研極細末。上第二次。以二等羅篩過。取齊晒乾。又方不用貫衆。則虫出來。猶未死也。

三上末 三稜醋煮。莪朮醋煮。各八兩。青木香。

西木香各四兩。雷丸醋煮二兩半。南木香二兩。已上六味。和一處研極細末。上第三次。以三等羅篩過。取齊。曬乾。

四上末 大黃鋤碎。酒浸曬乾。研細取淨末一斤。上第四次。以四等羅篩。取齊。曬乾。

五上末 黑牽牛半生半炒。研細取頭末淨一斤。上第五次。以五等羅篩過。取齊。曬乾。又方有枳殼一斤。爲母。有藟香四兩。和入諸藥。

右作五處另研極細末。要作五次上末。却用茵
陳半斤。大皂角一斤。煎汁濾淨。法水爲丸。如菜
菹大。晒乾。後用丁香末一兩。或加蘆薈末二兩。
亦妙。以前淨汁煎一滾。酒入丸藥。旋搖令光瑩。
爲度。再以阿膠二兩。以前汁熬溶。酒入丸藥。旋
搖光瑩。晒乾。壯人每服五錢。弱人每服四錢。更
以茶清吞下。小兒減半。

蕪荑散 治大人小兒。蛇咬心痛。經云。虫貫心則

殺人欲驗之。大痛不可忍。或吐青黃綠水涎沫。或吐虫出。發有休止。此是蛇心痛也。宜速療之。右爲細末。每服三錢。溫水七分。盞調和。服不拘時。甚者不過三服。小兒每服半錢。

仲景烏梅圓

烏梅 三百枚

細辛 六兩

乾薑 十兩

當歸 四兩

黃連 一斤

附子 六兩炮去皮

蕪荑

雷丸 各半兩

乾漆 槌碎炒火烟盡一兩

蜀椒

四兩
去汗

桂枝

六兩
去皮

人參

六兩

黃蘗

六兩

右十味。異搗篩合治之。以苦酒浸烏梅一宿。去核。蒸之五升米下。飯熟。搗成泥和藥。令相得。內臼中。與蜜杵二千下。圓如梧桐子大。先食飲服十圓。日三服。稍加至二十圓。禁生冷滑物臭食等。

萬應丸

取虫積神効

黑牽牛

取頭末

大黃

檳榔

各八兩

雷丸

醋煮

南木香

各一兩

沉香

五錢

右將黑牽牛。大黃。檳榔。和一處爲末。以大皂角。苦練皮。各四兩煎汁。法水爲丸。如葉荳大。後以雷丸。木香。沉香。和一處研末爲衣。每服三四十丸。五更用砂糖水送下。或作末服亦可。

集効丸

治因藏府虛弱。或多食甘肥。致蛔虫動。

作。心腹絞痛。發則種聚。往來上下。痛有休止。腹

中煩熱。口吐涎沫。是蛔虫。宜服此藥。若積年不
瘥。服之亦愈。又治下部有虫。生痔瘻痛。

木香

鶴虱

炒

訶子

麩裏煨
去核

檳榔

蕪荑

炒

附子

煨去
皮臍

乾薑

各七
錢半

大黃

一兩
半

烏梅

十四個
去核

右爲末。煉蜜丸如桐子大。每服三四十九。食前
用陳皮湯下。婦人淡醋湯送下。

備急丸

見第三十五

紫金錠

一名玉樞丹。一名神仙解毒萬病丹。治

一切藥毒。茄子毒。鼠莽毒。惡菌草。金石毒。喫疫

死牛馬肉毒。河豚毒。時行瘟疫。山嵐瘴瘧。忽喉

閉。纏喉風。脾病黃腫。赤眼瘡癰。衝冒寒暑。熱毒

上攻。或自縊溺水。打撲損傷。癰疽發背。未破魚

臍瘡腫。湯火所傷。百虫鼠犬蛇傷。顛邪狂走。鬼

胎鬼氣。並宜服之。凡人居家。或出入。不可無此

藥。真濟世衛家之寶。如尋藥寶。而最多。若遊宦

嶺表。纔覺意思不快。便服之卽安。二廣山谷間。有草曰胡蔓草。又名斷腸草。若人以急水吞之。急死。緩水吞之。緩死。又取毒蛇殺之。以草覆之。以水灑之。數日菌生其上。取爲末。酒調以毒人。始亦無患。再飲酒。卽毒發立死。其俗淫婦人多自配合北人。與人情分相好。多不肯逐北人回。陰以藥置食中。北人還。卽戒之曰。子某年來。若從其言。卽復以藥解之。若過期不往。必死矣。名

曰定年藥。北人屈彼亦宜誌之。若覺中毒。四大
不調。即便服之。或於雞豚魚羊鵝鴨等肉下藥。
復食此物。即觸發其毒。急服此藥一粒。或吐或
利。隨服便瘥。昔一女子久患勞瘵。爲屍虫所噬。
磨一粒服之。一時久吐下小虫千餘條。一大者。
正爲兩段。後只服蘇合香丸。半月遂服如常。至
牛馬六畜中毒。亦以此救之。無不効。

山茨菰

南北處處有之俗名金燈籠葉似韭花
似燈籠色白上有黑點結子三稜二月

開花結子四月初苗枯即空地得之遲則苗腐爛難尋矣與有毒老鴉蒜極相類但蒜無

毛茨拔上有毛包裹宜辨去皮洗極淨焙二兩

川文蛤

一名五倍子槌破洗刮內淨焙乾二兩

千金子

一名續遮子去殼揀色極白者用紙包裹換紙研數十次去盡油以色白再研

紙無油成霜為度一兩

麝香

揀盡血毛皮殼細研淨三錢

紅芽大戟

杭州紫大戟為上江南土大戟次之去蘆根洗極淨焙乾一兩半北方綿

大戟色白者大峻利反能傷人弱人服之有吐血者慎之

右各研爲細末和勻。以糯米粥爲劑。每料分作
四十粒。於端午重陽七夕合。如欲急用。辰日亦
可。於木臼中杵數百下。不得令孝婦人。孝子。不
具足人。雞犬之類見之。勿宜秘惜。不可廣傳。輕
之無効。如癰疽發背未破之時。用冷水磨塗
痛處。并磨服。良久覺痒立消。陰陽二毒。傷寒
心悶。狂言亂語。胸膈壅滯。邪毒未發。及瘟疫山
嵐瘴氣。纏喉風。冷水入薄荷一葉同研下。急

中顛邪。喝叫亂走。鬼胎鬼氣。並用煖無灰酒下。
自縊并落水死。心頭煖者。及驚死。鬼迷死。未
隔宿者。並冷水磨灌下。蛇犬蜈蚣傷。並用冷
水磨塗傷處。諸般瘡疾。不問新久。臨發時。煎
桃柳枝湯磨下。小兒急慢驚風。五疳八痢。蜜
水薄荷一葉同磨下。牙關緊急。磨塗一九。分
作三服。量大小與之。牙痛酒磨塗。及含藥少
許吞下。湯火傷。東流水磨塗傷處。打撲損

傷。炒松節無灰酒下。年深日久頭疼。太陽疼。
用酒入薄荷葉磨。紙花貼太陽穴上。諸般癩
疾。口眼喎斜。眼目掣𦦳。言語蹇澁。卒中風口噤。
牙關緊急。筋脉攣縮。骨節風腫。手足疼痛。行步
艱辛。一應風氣疼痛。並用酒磨下。有孕婦人不
可服。一方加山豆根全蝎
朱砂雄黃各一兩

四七湯 見第十七

枳桔二陳湯 見第四十八

平胃散

見第四十四

東垣溫胃湯 治服寒藥多致脾胃虛弱胃脘痛

白豆蔻

分二

益智

砂仁

厚朴

甘草

乾薑

薑黃

分各二

黃耆

陳皮

分各七

人參

澤瀉

分各三

右爲細末。每服三錢。水一盞。煎半盞。食前溫服。

來復丹

見第十七

理中湯 見第十七

東垣天台烏藥散 治一切沉寒痼冷。心腹攪痛。

并積年寒疝。

天台烏藥 木香 茴香 炒

青皮 去白 良薑 炒各五錢 檳榔 剉二枚

川楝子 十個 巴豆 十四枚

右十味。先以巴豆打碎同楝子用麩炒黑色。去巴豆麩。俱不用。外爲細末。每服一錢。溫酒調下。

痛甚者。炒生薑熱酒下。

和劑半硫丸 見第五十七

烏藥順氣散 治風氣攻注四肢。骨節疼痛。遍身

頑麻。及癱瘓。步履艱難。脚腰痿軟。或心腹疼痛。

麻黃 去根節

陳皮

烏藥 各二錢

白僵蚕 去系嘴炒

乾薑 炮五分

川芎

枳殼

桔梗

白芷

甘草 炒各一錢

水二鍾。薑三片。棗一枚。煎八分。食遠服。

鐵甕先生交感丹

見第五十八

溫膽湯

見第二十

小柴胡湯

見第四十三

醫燈續焰卷八終

醫燈續焰目錄

卷之九

疝氣脉証第六十四

桂附二陳湯

東垣川苦楝散

金匱烏頭煎

見第十七

和劑葫蘆巴丸

蘇合香丸

見第十八

桂枝湯

見第十九

東垣丁香棟實丸

茴香散

木香散

天台烏藥散

見第六十三

腰子散

五苓散

見第十七

仲景牡蠣澤瀉散

正氣天香散

見第十七

金匱蜘蛛散

荔枝散

三層茴香丸

濟生橘核丸

香附散

龍膽瀉肝湯

加味逍遙散

見第五十一

腰痛脉證第六十五

調肝散

加味逍遙散

見第五十一

逍遙散 見第五十一

東垣羌活勝濕湯

川芎肉桂湯

九味羌活湯 見第十六

金匱腎氣丸 見第十六

六味地黃丸 見第十六

直指青娥圓

東垣蒼朮湯

統旨清濕散

四物湯 見第二十一

平胃散 見第四十四

導痰湯 見第四十一

保命煨腎丸

黑地黃丸 見第五十一

知藥地黃丸 見第三十四

局方普賢正氣散

二至丸

子和無比山藥丸

金匱腎着湯

見第二十一

子和禹功散

良方人參順氣散

烏藥順氣散

見第六十三

調榮活絡飲

仲景桃仁承氣湯

見第二十

滾痰丸

見第十七

脚氣脉證第六十六

麻黃湯

見第十六

桂枝湯

見第十九

九味羌活湯

見第十六

敗毒散

見第三十七

集驗麻黃左經湯

得効芎芷香蘇散

大黃左經湯

小柴胡湯

見第四十三

半夏左經湯

大料神秘左經湯

加味敗毒散

胃苓湯

見第十七

六物附子湯

仲景麻黃附子細辛湯

金匱八味丸

見第十六

茱萸木瓜湯

神應養真丹

追毒湯

卷之十

痿病脉證第六十七

升溪虎潛丸

補陰丸

四物湯

見第二十一

三因加減四斤丸

東垣神效黃耆湯

錢氏瀉黃散

見第四十

仲景炙甘草湯

見第三十三

黑地黃丸

見第五十一

知藥八味丸

見第五十

加味逍遙散

見第五十一

胃苓湯

見第十七

金匱防己黃耆湯

東垣參朮湯

六味地黄丸

見第十六

痺病脉證第六十八

當歸湯

紫蘇子湯

茯神湯

革薺丸

奇効人參散

加味五痺湯

溫中法麴丸

黃耆丸

茯苓川芎湯

腎瀝湯

仙靈脾散

三因控涎丹

見第二十

烏藥順氣散

見第六十五

丹溪二妙散

東垣神効黃耆湯

見第六十七

東垣溫經除濕湯

史國公浸酒方

五疰脉證第六十九

金匱茵陳湯

金匱消石礬石散

金匱梔子大黃湯

金匱黃耆芍桂酒湯

金匱桂枝加黃耆湯

金匱猪膏髮煎

金匱茵陳五苓散

大黃硝石湯

小半夏湯

小柴胡湯

見第四十三

小建中湯

卷之十一

水病脉證第七十

金匱防己黃耆湯

見第六十七

仲景越婢湯

金匱防己茯苓湯

金匱蒲灰散

越婢加朮湯

即前越婢湯

甘艸麻黃湯

當歸散

醫燈續焰

卷十一 目

五

陸地舟

分氣補心湯

分氣香蘇飲

導水茯苓湯

胃苓湯

見第十七

元戎調胃白朮澤瀉散

金匱腎氣丸

見第十六

濟生腎氣丸

調榮飲

四製香附丸

濟生實脾飲

復元丹

見第六十四

金匱桂枝去芍藥加麻辛附子湯

金匱枳朮湯

麻黃附子湯

葶蘆丸

和劑五皮飲

除濕湯

見第二十一

四磨湯

疏鑿飲子

五苓散

見第十七

和劑木香流氣飲

和劑黑錫丹

和劑蘇子降氣湯

寶鑑導滯通經湯

和劑木瓜圓

消導寬中湯

加味五皮湯

消風敗毒散

和劑升麻和氣散

補中益氣湯

見第三十九

六味地黃丸

見第十六

東垣人參平肺散

八正散

見第四十九

仲景梔子豉湯

醫燈續焰卷九

錢塘後學潘 楫碩甫註

同邑社盟王佑賢聖翼評

門人 余正已君求 校

李國璋彥卿

疝氣脉證第六十四

疝氣弦急積聚在裏。牢急者生。弱急者死。

疝氣者氣聚而大。外仍斂束。故脉則見弦急而症

則多脹痛也。字下從山。亦是聚而大之之義。皆從寒濕積鬱于裏得之。間有曰風。曰熱者。亦不過寒風濕熱耳。其發也。多惡寒寒熱。嘔逆不食。狀類傷寒。但兼腹痛。或小腹痛脹。或只達臍痛。或上衝心胸痛。或傍引脇肋痛。或臍下鞭急。或氣走腸鳴。或控引鞞丸。痛脹急墜。或氣歸囊袋。收縱不時。甚或囊外或冷。或濕。或熱。或紅。亦有出水。及久久成癰者。此皆裏有故積。復感風寒水濕。或加奔走焦勞。

以致觸動積邪。氣聚而發。或一二日。或延多日。得
溫煖及出汗。俱能氣散而解也。其脈弦急者。弦急
乃厥陰肝脈。疝多發于肝故也。又弦歛急直。氣不
鼓暢。主諸痛脹。疝則未有不痛不服者。若弦急而
牢。見積聚之有根。亦徵元本之壯實。脈證兩宜。故
曰生。若但急而弱。急則邪盛。弱則正衰。更非積聚
在裏者之所宜。故曰死。所云多發于肝者。素問五
藏生成論。平人氣象論。長刺節論。謬刺論。及靈樞

經脈篇之言也。而素問骨空論又云。有發于任脈。督脈者。素問陰陽別論。五藏生成論。脈要精微論。玉機真藏論。大奇論。四時刺逆從論。及靈樞邪氣。藏府病形篇。經筋篇。又皆云有發于別藏。別府者。骨空論言任脈有內結七疝之名。而未有七疝之狀。巢氏因敘七疝曰厥疝。曰癰疝。曰寒疝。曰氣疝。曰盤疝。曰胙疝。曰猥疝。而張子和復立七疝之名曰寒疝。曰水疝。曰筋疝。曰血疝。曰氣疝。曰狐疝。曰

疝。疝外復有小兒癰疔。及膀胱小腸等氣。亦指稱
爲疝者。聚訟紛紛。迄無定論。近惟張景岳一辯。最
爲詳悉得理。茲錄于左。不敢再贅。景岳曰。愚按本
經諸篇。所言疝證不一。有云狐疝者。以其出入不
常也。有癰疔者。以其頑腫不仁也。有衝疝者。以其
自少腹上衝心而痛也。有厥疝者。以積氣在腹中
而氣逆爲疝也。有瘕疝者。以少腹冤熱而痛出白。
一名蠱也。有六經風疝者。如四時刺逆從論之所

云也。有小腸疝者。如邪氣藏府病形篇曰。小腸病者。小腹痛。腰脊控舉而痛。時窘之後者。亦疝之屬也。是皆諸疝之義。按骨空論曰。任脉爲病。男子內結七疝。女子帶下瘕聚。蓋任脉者。起于中極之下。以上毛際。循腹裏。上關元。總諸陰之會。故諸疝之在小腹者。無不由任脉爲之原。而諸經爲之派耳。云七疝者。乃總諸疝爲言。如四時刺逆從論所言者六也。邪氣藏府病形篇所言者一也。蓋以諸經

之疝。所屬有七。故云七疝。若狐癰衝厥之類。亦不過爲七疝之別名耳。後世如巢氏所敘七疝。則曰厥。癰。寒。氣。盤。疝。至張子和非之曰。此俗工所立謬名也。蓋環陰器上抵少腹者。乃屬足厥陰肝經之部分。是受疝之處也。又曰。凡疝者。非肝木受邪。則肝木自甚。皆屬肝經。於是亦立七疝之名。曰寒。水。筋。血。氣。狐。癰。治多用下。繼自丹溪以來。皆宗其說。然以愚觀之。亦未爲得。夫前陰小腹之間。乃足

三陰陽明任督脉之所聚。豈得獨以厥陰經爲言。但如四時刺逆從論所云。六疝皆兼風言者。本非外入之風。蓋風屬肝。肝主筋。故凡病各經之疝者。謂其病多在筋而皆挾肝邪。則可。若謂必在厥陰。則不可也。後世議論徒多。又安能出內經之範圍哉。學者當以經旨爲正。至于治之之法。大都此證寒則多痛。熱則多縱。濕則多腫墜。虛者亦然。若重在血分者不移。在氣分者多動。分察六者於諸

經。各因其多少虛實兼治之。自無不効也。

巢氏七疝狀

厥逆心痛。足寒諸飲食吐不下。名曰厥疝。

宜桂附二陳湯

之類

腹中氣滿。心下痛。氣積如臂。名曰癥疝。

宜東垣川苦棟散

寒飲食。即脇下腹中盡痛。名曰寒疝。

宜仲景烏頭煎和劑葫蘆

巴丸之類

腹中乍滿乍減而痛。名曰氣疝。

宜蘇合香丸東垣川苦棟散之類

腹中痛在臍傍名曰盤疝

宜桂枝湯東垣丁香棟實丸之類

腹中臍下有積聚名曰肘疝

宜茴香散之類

小腹與陰相引而痛大便難名曰狼疝

宜木香散丁香棟實

丸之類

張子和七疝狀

寒疝其狀囊冷結硬如石陰莖不舉或控睪丸而

痛得於坐卧濕地或寒月涉水或冒雨雪或坐卧

磚石或風冷處使內過勞宜以溫劑下之久而無

子。宜東垣天台烏藥散之類

水疝。其狀腎囊腫痛。陰汗時出。或囊腫而狀如水
晶。或囊癢而搔出黃水。或少腹中。按之作水聲。得
干飲水醉酒。使內過勞汗出。而遇風寒濕之氣。聚
於囊中。故水多。令人爲卒疝。宜以逐水之劑下之。
有漏針去水者。人多不得其法。宜屢子散五苓散仲景牡蠣澤瀉散
之類

筋疝。其狀陰莖腫脹。或潰或膿。或痛而裏急筋縮。

或莖中痛。痛極則痒。或挺縱不收。或白物如精。隨
溲而下。久而得于房室勞傷。及邪術所使。宜以降

心之劑下之。

宜白芍茯苓當歸小茴香
青皮黃蘗蒼朮川棟之類

血。疝其狀如黃瓜。在少腹兩傍。橫骨兩端約中。俗

云便癰。得于重感。春夏大燠。勞於使內。氣血流溢。

滲入脬囊。留而不去。結成癰腫。膿少血多。宜以和

血之劑下之。

宜歸芍牛膝靈脂青皮木
香丹皮沒藥玄胡索之類

氣疝。其狀上連腎區。下及陰囊。或因號哭忿怒。則

各另立諸
之名各隨

氣鬱而脹。怒哭號罷。則氣散者是也。有一治法。以
針出氣而愈者。然針有得失。宜以散氣之藥下之。
或小兒亦有此疾。俗曰偏氣。得於父已年老。或年
少多病。陰痿精怯。強力入房。因而有子。胎中病也。
此證不治。惟築賓一穴灸之。宜正氣天
香散之類

狐疝。其狀如瓦。卧則入小腹。行立則出小腹。入囊
中。狐則晝出穴而溺。夜則入穴而不溺。此疝出入。
上下往來。正與狐相類也。亦與氣疝大同小異。今

形狀而
不言有寒
濕防水氣血
之凝總不出
中厥氣為
其耳

人帶鈞鈴是也。宜以逐氣流經之藥下之。

宜金匱
蜘蛛散

之類

癰疽其狀陰囊腫繩如升如斗。不痒不痛者是也。

得之地氣卑濕所生。故江淮之間。湫澹之處。多感

此疾。宜以去濕之藥下之。女子陰戶突出。雖亦此

類。乃熱則不禁固也。不可便謂虛寒而澁之。燥之。

補之。本名曰瘕。宜以苦下之。以苦堅之。

宜荔枝散
三層茴香

丸生橘核丸香附散之類。女子陰突。肝火居多。宜龍膽瀉肝湯加味。逍遙散或少加升提之類。

已上子和論疝七條。形證可謂詳悉。但七疝七名。形證亦異。治之當各有方。而俱云下者。恐出偏見。今擬對證方藥于下。在診之者。合宜則用。亦不敢槩云不可下也。

附方

桂附二陳湯

卽二陳加肉桂附子

東垣川苦楝散

木香

川楝子

剉細用巴豆十粒打碎一處炒黃去巴豆

茴香

鹽一匙炒黃
去鹽各一兩

右爲細末。每服二錢。空心食前。溫酒調下。

金匱烏頭煎

見第十七

和劑葫蘆巴丸 治小腸疝氣。偏墜陰腫。小腹有

形如卵。上下來去。痛不可忍。或絞結繞臍攻刺。

嘔吐悶亂。

葫蘆巴

炒一斤

茴香

鹽炒十
二兩

吳茱萸

洗炒
十兩

川楝子

去核炒一
斤二兩

巴戟

去心
炒

川烏

炮去皮
各六兩

右爲末。酒糊丸如桐子大。每服十五丸。至二十丸。空心溫酒下。小兒五丸。茴香湯下。食前。一方有黑牽牛。

蘇合香丸

見第十八

桂枝湯

見第十九

東垣丁香棟實丸

治男子七疝。痛不可忍。婦人

瘕聚帶下。

當歸

去蘆

附子

川楝子

茴香

炒各一兩

右四味剉碎。以好酒三升。同煮酒盡。焙乾。作細末。一兩。再入下項藥。

丁香

木香

各五分一作二錢

全蝎

十三個

玄胡索

五錢一作一兩

右四味。同爲細末。入前項當歸等末拌勻。酒糊丸如桐子大。每服三十丸。至百丸。空心食前溫

酒送下。一方無當歸木香。名苦棟丸。

茴香散 治膀胱氣痛。

茴香

蓬朮

京三稜

金鈴子肉

各一兩

炙甘草

半兩

右爲細末。每服二錢。熱酒調服。每發痛甚連日。只二三服立定。

木香散 治心疝。小腹痛悶不已。

木香

陳皮

良薑

乾薑

訶子去核

枳實各一錢半

草豆蔻

黑牽牛

川芎各一錢

水二鍾煎一鍾食前服。武爲細末。每服二錢。白

湯調服。

東垣天台烏藥散見第六十三

腰子散 治腎氣作痛

黑牽牛

炒熱

白牽牛

炒熱

爲細末。每用三錢。猪腰子一對。薄切開縫。入川

椒五十粒。茴香一百粒。以牽牛末。徧摻入腰子中。線紫濕紙數重裹。煨香熟。出火氣。燈後空心嚼喫。好酒送下。少頃就枕。天明取下惡物卽愈。

五苓散

見第十七

金匱牡蠣澤瀉散

牡蠣

澤瀉

蜀漆

洗去腥

活萎根

葶藶子

商陸根

熬

海藻

洗去鹹已上各等分

右七味。異搗下。篩爲散。更入臼中治之。白飲和服。方寸七。小便利止後服。

正氣天香散 見第十七

金匱蜘蛛散

蜘蛛 十四枚
炒焦

桂 半錢要入厥陰
取其肉厚者

右爲散。每服一錢。蜜丸亦可。雷公云。凡使勿用五色者。兼大身上有刺毛者。并薄小者。須用屋西南有網。身小尻大。腹內有蒼黃膿者。真也。凡

此方
諸而
也

用去頭足了。研如膏。投藥中。此余之法。仲景妙
焦用。全無功矣。

荔枝散 治疝氣陰核腫大。痛不可忍。

荔枝核

十四枚燒灰
存性用新者

八角茴香

炒

沉香

木香

青鹽

食鹽

各一錢

川棟肉

小蘘香

各二錢

右爲細末。每服三錢。空心熱酒調服。

三層茴香丸 治腎與膀胱俱虛。爲邪氣搏結。遂

成寒疝。伏匿不散。臍腹疼痛。陰核偏大。膚囊腫。重墜滋長。有妨行步。癢痒不止。時出黃水。浸成瘡瘍。或長怪肉。屢治不痊。以致腎經閉結。陰陽不通。外腎腫脹。冷硬如石。漸大。皆由頻服熱藥內攻。或因撻取。以致如此。用藥溫導陽氣。漸退寒邪。補虛消疝。暖養腎經。能使復元。一應小兒氣寒疝之疾。久新不過三料。

第一料

舶上茴香

用鹽半兩同炒焦黃和鹽秤

川棟子

炮去

沙參

洗到

木香

各一兩

右爲細末。煮米糊爲丸。如桐子大。每服二十九。空心用溫酒。或鹽湯下。日三服。小病一料可安。纔盡。便可用第二料。

第二料藥加

草撥

一兩

檳榔

半兩

右共前藥六味。重五兩半。爲末。依前糊丸。丸數

湯使亦如前。若病未愈。服第三料。

第三料藥加

白茯苓

四兩紫實者去黑皮

黑附子

炮去皮臍秤半

兩或加作一兩

右通前八味。重十兩。並依前糊丸湯使。丸數加至三十丸。小腸氣發頻。及三十年者。寒疝氣如栲栳大者。皆可消散。神効。

濟生橘核丸 治四種癰病。卵核腫脹。偏有大小。

或堅硬如石。痛引臍腹。甚則膚囊腫脹成瘡。時
出黃水。或成癰潰爛。

橘核

海藻

昆布

海帶

各洗

川棟肉

炒

桃仁

每炒各一兩

製厚朴

木通

枳實

每炒

延胡索

炒

桂心

木香

各半兩

爲細末。酒糊丸如梧子大。每服七十丸。空心鹽

酒鹽湯下。虛寒甚者。加炮川烏一兩。堅脹久不

消者。加礪砂二錢。醋煮旋入。

香附散 治癰疽脹及小腸氣。

右用香附不拘多少。爲末。每用酒一盞。入海藻一錢。煎至半盞。先撈海藻細嚼。調香附末二錢服。一方以海藻爲末。用熱酒調尤効。甚者灌之。一方熱酒下荊芥末。

龍膽瀉肝湯 治肝經濕熱。兩肋腫痛。或腹中疼痛。或小便澀滯等證。

龍膽草

酒拌炒黃

澤瀉

各一錢

車前子

炒

木通

生地黃

酒拌

山梔

炒

當歸

酒拌

黃芩

炒

甘草

各五分

右水煎服

加味道遙散

見第五十一

腰痛脉證第六十五

腰痛之脉。多沉而弦。兼浮者風。兼緊者寒。弦滑痰飲。濡細腎着。大乃腎虛。沉實閃肭。

醫燈續編

卷九

十五

陸地舟

腰痛者。足之六經病也。足三陽從頭走足。足三陰
從足入腹。各經受邪。則隨各經之所過者爲痛。與
頭心爲痛之義畧同。而手之六經不與焉。以手經
不至于腰也。其因有三。曰外因。內因。曰不內外因。
外因者。風熱寒濕也。木化風。火化熱。水化寒。土化
濕。風多傷厥陰。火多傷少陽。寒多傷太陽。少陰。濕
多傷太陰陽明。此言邪傷足三陰三陽之經也。亦
各從其類也。厥陰腰痛。腰中如張弓弩弦。宜調肝散加朮

遺散之類 少陽腰痛。如以針刺其皮中。循循然不可

以俛仰。不可以顧。宜道遙散倍白芍加枳殼木香之類 太陽腰痛。則

引項脊尻背如重狀。宜東垣羌活勝濕湯川芎肉桂湯九味羌活湯之類 足

少陰腰痛。痛引脊內廉。宜金匱八味丸六味丸青娥圓之類 太陰散

脉腰痛。腰下如有橫木居其中。甚則遺洩。宜東垣蒼朮湯

統旨清濕散之類 陽明腰痛。不可以顧。顧如有見者。善悲。

宜四物湯平胃散導痰湯之類 內因者。恐懼失志。恚怒忿恨。抑鬱

憂思也。恐懼失志則傷腎。恚怒忿恨則傷肝。抑鬱

憂思則傷脾。此言情志不得其所。三陰藏氣自傷。

也。亦各從其類也。腎傷腰痛。虛羸不足。面目黧黑。

遠行久立。力不能盡。宜六味丸煨腎丸
黑地黃丸之類肝傷腰痛。

腹急脇脹。目視眈眈。所祈不得。意淫于外。宗筋弛

縱。及爲白淫。宜六味丸加
知藥之類脾傷腰痛。肌肉濡漬。痺

而不仁。飲食不化。腸胃脹滿。閉墜腰脇。宜平胃散
局方普賢

正氣散不內外因者。房室過度。煩勞不節。以致精

力耗竭。腰脊空虛。發爲腰痛。蓋精藏于腎。而腰其

屬不

腎之府力出于脊而腰者脊所系其痛轉側屈伸

不得膝酸脛冷腰中冷面黑偃僂不能久立宜二至九

子和無比山藥九六味丸之類一種腰痛因作勞多汗衣裏冷濕

久久得之其證身重不渴小便自利食飲如常腰

以下冷重如帶五千錢者名曰腎着腎着者因勞

乘之乘其已所勝也濕因注滲腰脊之間着而不

行猶邪有着落無礙他處故但腰痛而重更無他

證如上所云宜仲景腎着湯子和一種因搏擊墮

瘀結而氣久方行。令人偃僂腫痛而重。牽引脇脊。

氣滯者。呼吸亦痛。不能轉側。鼻塞。身不動。則痛亦

定。

宜良方人參順氣散
為藥順氣散之類

血瘀者。亦轉側不能。腰下

重痛。若錐刀之刺。大便黑。面目黃。日輕夜重。

宜調
榮活

絡條仲景桃仁
承氣湯之類

一種積痰停飲。阻滯于腰脇之間。

有礙氣道。亦能作痛。其痛或作或止。或移易不定。

或不仁。或麻木。或痛處如水。腰脊重墜。

宜導痰湯
王隱君漆

之類以上諸證。大抵外因寒濕多。而風熱少。內因

腎多。肝次之。而脾藏少。不內外因。感亦明顯。若謹
慎善攝之人。自不多罹。并可終身不一遇也。諸腰
痛。脉多沉弦者。沉爲在裏。在下。弦則爲痛。故多沉
弦也。兼浮者。沉弦中有泛泛欲浮之勢。所謂如水
漂木。舉之有餘。是狀風邪虛浮之性。非言在表之
浮也。兼緊者寒。寒緊歛也。兼滑者痰飲。痰飲滑利
也。兼濡細者腎着。腎着者濕。濡細滲着也。兼大者
腎虛。腎虛不斂藏而反空鬆虛大也。兼實者閃肋。

閃胸非血瘀。則氣滯。皆成凝滯。故沉實也。

附方

調肝散 治鬱怒傷肝。發為腰痛。

半夏

製三分

辣桂

宣木瓜

當歸

川芎

牛膝

細辛

各二分

石菖蒲

酸棗仁

盪去皮
微炒

甘草

炙各一分

每三錢薑五片。棗二枚。煎服。

加味逍遙散

見第五十一

東垣羌活勝濕湯 治脊痛項強腰似折項似拔
衝頭痛乃足太陽經不行也

羌活

獨活

藥本

防風

各一錢

蔓荊子

三分

川芎

二分

甘草

炙五分

右㕮咀作一服水二盞煎一盞去滓食後溫服

東垣川芎肉桂湯 丁未年冬曹通甫自河東來

有役人小翼。宿於寒濕之地。腰痛不能轉側。兩
脇痛急作痛。月餘不愈。腰痛論中所說。皆爲足
太陽。足少陰血絡中。有凝血作痛。間有一二證。
屬少陽膽經。外絡脉病。皆宜去血絡之凝乃愈。
其內經有云。冬三月。禁不得針。只宜服藥通其
經絡。破其血絡中敗血。此方主之。

羌活

半錢

柴胡

錢一

獨活

五分

肉桂

桑木

各一錢

防風

漢防已

各三分

桃仁

五枚去皮另研如泥

歸稍

甘草

炙

川芎

各一錢

炒麴

右咬咀。水酒煎。去滓食遠熱服。

九味羌活湯

見第十六

六味丸

見第十六

八味丸

見第十六

直指青娥圓 治腎虛腰痛。益精助陽。烏鬚壯脚。

用安胎飲吞。神効。

清元氣虛寒
者為宜故又
能安胎以女
子系胞處也

破故紙

四兩炒香

杜仲

去麋皮到四兩用生薑二兩半擦淹炒乾

右為末。用胡桃肉三十個研膏。入少熟蜜圓桐

子大。每服五十圓。食前下。

東垣蒼朮湯 治濕熱脚腿疼痛。

蒼朮

五錢去濕止痛

柴胡

三錢行經

防風

一錢半去風勝濕

黃藥

一錢半始得之時寒也久不愈寒化為熱除熱止痛

水二鍾。煎至一鍾。空心食前服。

統旨清濕散

黃蘗

鹽水拌炒 一錢五分 澤瀉 一錢

蒼朮

一錢半 米泔浸炒

杜仲

白芍藥

煨

牛膝

酒浸

木瓜

薏靈仙

陳皮

各一錢

甘艸

三分

痛甚者加乳香沒藥末五分臨服調入。

四物湯

見第二十一

平胃散

見第四十四

導痰湯

見第四十一

保命煨腎丸 治腎肝損及脾損穀不化宜益精

緩中消穀。

牛膝

草薺

杜仲炒去絲

白蒺藜

防風

兔絲子酒浸

肉苁蓉酒浸

葫蘆巴

破故紙酒炒各等分

官桂減半

右爲細末將猪腰子製如食法搗爛煉蜜和作丸如桐子大每服五七十丸空心用溫酒送下

治腰痛不起甚効

黑地黄光

見第五十一

知榮八味丸

見第五十四

和劑普賢正氣散

陳皮

半夏

蒼朮

厚朴

藿香

甘草

生薑

各等分

每服五錢。水二盞。葱二段。黑豆百粒。煎八分。不

習至

藥者去附子加肉苁蓉一兩。

子和無比山藥丸 治諸虛百損。五勞七傷。肌體

消瘦。目暗耳鳴。

赤石脂 煨

茯神 去皮

山茱萸 去核

熟乾地黄 酒浸

巴戟 去心

牛膝 去根 酒浸

澤瀉 已上各一兩

杜仲 去皮切 薑汁炒

龜絲子 酒浸

五味子 兩 揀六

肉蓯蓉 酒浸 四兩

右爲細末。煉蜜爲丸如桐子大。每服三十丸。空

心溫酒。或鹽湯送下。

腎着湯

見第二十一

子和禹功散

黑牽牛

四兩

茴香

炒一兩

右爲末。薑汁調一二錢服。

良方人參順氣散 治氣滯腰痛。

人參

川芎

桔梗

白朮

白芷

陳皮

枳殼

麻黃

去節

烏藥

白薑炮

甘草灸各一錢

水二鍾煎一鍾。或爲細末。食前用甘草湯調服。

一方加五加皮一錢。

烏藥順氣散見第六十三

調榮活絡飲 治失力腰閃。或跌撲瘀血。及大便不通而腰痛。

川大黃

當歸條

川牛膝

去蘆酒洗

杏仁

去皮研如泥各二錢

赤芍藥

紅花

羌活

懷生地黃

酒洗各一錢

川芎

一錢半

桂枝

三分

水一鍾半。煎八分。食前溫服。

桃仁承氣湯

見第二十

滾痰丸

見第十七

腳氣脉證第六十六

腳氣有四。遲寒數熱。浮滑者風。濡細者濕。

腳氣一證。經名厥。漢名緩風。宋齊後始名腳氣。陳

疾治

其

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

無擇謂風寒暑濕四邪皆能成。今歷診是證。成于
寒濕者。十常八九。經曰。清濕襲邪。病起于下。信然
哉。其始發也甚微。發亦易解。故人常忽而不覺。覺
亦不速治。及其深久。愈發愈重。甚至痿痺不仁者。
有之。入腹。衝心者有之。身命從此而殞。可哀也。足
三陰三陽六經。皆有此證。而發于三陽者輕。三陰
者重。以三陰屬藏。經絡居裏。若非藏氣大虛。邪不
易及。其證不論陰陽。初發時。大類傷寒。頭痛發熱。

爲患此當用
字和湯藥之
法爲妙也
能別三陰三
陽經絡清楚
則取効自捷
即使通腿紅
腫亦自發有
是處形有是
表非可泛然
論此論
請詳且盡

惡寒嘔吐。但足屈伸不能。或痛或紅爲異耳。在陽
多惡寒壯熱頭痛。或骨節痛。或嘔吐渴煩。或叫號
譫語。或腿脚紅紫極熱。大腫大痛。手不可按。或頑
痺麻木。患多在腿外廉陽分。三陽經所過之處。面
光澤。脉多浮。在陰多惡寒。甚或厥逆。不發熱。或微
熱。頭不痛。或骨痛筋攣。或嘔逆。或神昏沉默。或腹
痛下利。或畏見光明。或大小便閉。或心煩動悸。或
小腹不仁。或衝胸悶亂。痛處腫痛。或不腫。或微赤

而熱或反極冷。患多在腿內廉陰分三陰經所過之處面青慘脉多沉。此言陰陽之大槩若細別之。

太陽則發熱頭痛惡寒目眩項強腰脊身體及外

踝後至小指外側皆痛

宜仲景麻黃湯桂枝湯九味羌活湯敗毒散集驗麻

黃左經湯之類

陽明則翕翕發熱口鼻乾善欠

入服自辟

膝臑胛外廉以下足跗中指內俱痛

宜得効芩芷香蘇散大黃

左經湯之類

少陽則往來寒熱口苦脇痛面垢頭目眩

痛腋下馬刀腫痛髀膝外至胛及外踝諸指節皆

痛

宜小柴胡湯
夏主經湯之類

三陽并合為病則憎寒壯熱自

汗惡風或無汗惡寒眩暈重着關節掣痛手足均

身寒痛令痺腰腿緩縱不隨心躁氣上嘔吐下利

其脈浮弦緊數

宜大料神私左經湯
加味敗毒散之類

太陰則腹滿

胸膈痞舌系急循肝骨下股膝內前廉內踝過核

骨後廉足大指之端內側皆痛

宜胃苓湯六物
附子湯之類少

陰則腰脊痛上衝胸咽饑不能食面黑大小淋瀝

善恐小趾足心內踝跟中肘內廉皆痛

宜麻黃附
子細辛湯

金匱八味丸之類

厥陰。則腰脇偏痛。脚舉。惡。噦。乾嘔。逆。洞

泄。足大趾連足跌上廉。上膈至內廉。循股環陰。小

腹夾臍諸處脹痛。

宜萊菔木瓜湯神應養其升之類

三陰并合為

病。則四肢拘攣。上氣喘滿。小便閉澀。心熱煩渴。偏

身浮腫。脚弱緩縱。不能行步。

宜加味敗毒散進毒湯之類

已上

六經受病。流注自汗。為風勝。

脈多浮滑宜羌活獨活防風桂枝

無

汗疼痛為寒勝。

脈多遲宜桂附薑辛

熱煩為暑勝。

脈多數宜多黃

芩黃柴木

重着腫滿為濕勝。

脈多濡細宜多蒼朮澤瀉薏苡防已茯苓

瓜香薷

至如防已。木瓜。米仁。檳榔。蒼朮。黃蘗。肉桂。桂枝。巴戟。萎蕤。木通。羌活。枳殼。澤瀉。桑枝之類。各隨其氣所勝者而偏調之。證相宜者而倍用之。又不可拘于一方也。東垣謂此疾南方卑下。乃清濕之邪。外襲經絡而成。如北方地高外鮮水濕。發此者皆內傷酒乳。濕熱之邪下注也。故南則宜作寒濕治。北則宜作濕熱治。此雖發前人之未發。恐未必盡然也。南方固下。豈可無寒濕之邪。北方固高。豈無

踐涉洗濯之事。是在圓機者。謹察證脉而分別之。斯善矣。

附方

仲景麻黃湯

見第十六

仲景桂枝湯

見第十九

九味羌活湯

見第十六

敗毒散

見第三十七

集驗麻黃左經湯

治風寒暑濕流注足太陽經

佐實目經脉
 行血氣通
 以營於
 者也為邪
 若使致留
 此湯能佐
 送邪以復
 道故名

腰足攣痺關節重痛。行履艱難。憎寒發熱。無汗
 而寒。或自汗惡風。頭痛眩暈。并一切癰瘕麻木
 等證。

麻黃

去節

乾葛

細辛

去苗

白朮

去蘆

茯苓

去皮

防己

去皮

桂心

羌活

去蘆

防風

去蘆

甘草

炙各等分

右咬咀。每服七錢。水二盞。薑五片。棗一枚。煎一

薑。空心服。自汗去麻黃。加肉桂。芍藥。重着加朮。

陳皮。無汗。減桂。加杏仁。澤瀉。

得効。芎芷香蘇散。

川芎

錢七

甘艸

錢二

紫蘇葉

乾葛

白茯苓

柴胡

兩各半

半夏

錢六

枳殼

炒三錢

桔梗

生二錢半

陳皮

半三錢

每服三錢。水一盞。薑三片。棗一枚。煎八分。不拘。

時溫服。

大黃左經湯 治風寒暑濕流注足陽明經腰脚痺痛行步艱難涎潮昏塞大小便秘澀腹痛嘔吐或復下利惡聞食氣喘滿肩息自汗譫妄並宜服之。

大黃

煨

細辛

去苗

茯苓

去皮

防己

去皮

羌活

去蘆

黃芩

前胡

去蘆

枳殼

去穢炒

厚朴

薑製

甘草

炙

杏仁

去皮尖、
麝炒

右各等分。每服七錢。水一盞半。薑五片。棗一枚。
煎八分。空心熱服。腹痛加芍藥。祕結加阿
膠。喘急加桑白皮。紫蘇。小便秘加澤瀉。

四肢瘡痒浸淫。加升麻。

各等分

仲景小柴胡湯

見第四十三

半夏左經湯 治足少陽經受風寒濕暑。流注發

熱。腰脚俱痛。頭疼眩暈。嘔吐酸水。耳聾驚悸。熱

悶心煩氣促喘滿肩背麻痺腰腿不隨

半夏湯洗七次切片 乾葛 細辛去苗

白朮去蘆 茯苓去皮 桂心

防風去蘆 乾薑炮 黃芩

甘草炙 柴胡去蘆 麥門冬去心各七錢半

右咬咀。每服七錢。水一盞半。薑五片。棗二枚。煎

一盞。去滓。空腹服。熱悶。加竹瀝。每服半合。喘滿。

加杏仁。桑白皮。

大料神秘左經湯 治風寒暑濕流注足三陽經

手足拘攣疼痛行履艱難憎寒發熱自汗惡風
或無汗惡寒頭眩腰重關節掣痛或卒中昏塞
大小便秘澁或腹痛嘔吐下利惡聞食臭髀腿
頑痺緩縱不隨熱閤驚悸心煩氣上臍下冷痺
喘滿氣逆

麻黃

去節

乾葛

細辛

去苗

厚朴

去粗

茯苓

去皮

防已

去皮

枳殼

去殼炒

桂心

羌活

去蘆

防風

去蘆

柴胡

去蘆

黃芩

半夏

酒洗七次

乾薑

炮

麥門冬

去心

甘草

炙各等分

右咬咀。每服七錢。水一盞半。生薑五片。棗一枚。

煎一盞去滓。空心服。自汗加牡蠣。白朮。去麻。

黃。腫滿加澤瀉。木通。熱甚無汗。減桂。加橘。

皮。前胡。升麻。腹痛吐利。去黃芩。加芍藥。附子。

炮 大便秘加大黃竹瀝 喘滿加杏仁桑白
皮紫蘇等分凡有此病備細詳證逐一加減無
不愈者。

加味敗毒散 治三陽經腳氣流注脚踝焮熱赤

腫寒熱如瘧自汗惡風或無汗惡寒。

人參 去蘆

赤茯苓 去皮

甘艸 炙

芎藭

前胡 去蘆

羌活 去蘆

獨活 去蘆

枳殼 去瓢炒

桔梗 去蘆

大黃炭

蒼朮米泔浸各等分

右每服五七錢。水一盞半。薑五片。薄荷五葉。煎一盞去滓熱服。皮膚赤疹。加蟬蛻。

胃苓湯見第十七

六味附子湯 治四肢流注于足太陰。骨節煩疼。四肢拘急。自汗短氣。小便不利。惡風怯寒。頭面手足腫痛。

附子去皮臍

桂心

防己去皮各四兩

白朮

去蘆

茯苓

去皮各三兩

炙甘草

二兩

右咬咀。每服五錢。水二盞。生薑七片。煎一盞。去

滓。空心溫服。

仲景麻黃附子細辛湯

麻黃

去節

細辛

各二兩

附子

一枚炮

右三味。以水一斗。先煮麻黃減二升。去上沫。內

藥。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。

八味丸

見第十六

茱萸木瓜湯 治脚氣衝心。悶亂不識人。手足脉

欲絕。

吳茱萸

半兩

乾木瓜

一兩

檳榔

一兩

右咬咀。每服八錢。以水一盞半。生薑五片。煎一
盞。去滓溫服。不拘時候。

神應養真丹 治厥陰肝經受邪。四氣所傷。肝藏

或左癱右瘓。涎潮昏塞。半身不遂。手足頑麻。言

語蹇澁。頭旋目眩。牙關緊急。氣喘自汗。心神恍

惚。肢體緩弱。上攻頭目。下注脚膝。榮氣凝滯。遍身疼痛。兼治婦人產後中風。角弓反張。墮車落馬。打撲傷損。瘀血在內等證。

當歸

酒浸去蘆

天麻

川芎

羌活

去蘆

白芍藥

熟地黃

各等分

右爲細末。煉蜜和丸。如彈子大。每服一九。木瓜兔絲子煎酒下。脚痺薏苡仁煎酒下。中風溫酒米湯下。一方無羌活。入木瓜。熟阿膠等

分。

追毒湯 治肝腎脾三經。爲風濕寒熱毒上攻。陰

陽不和。四肢拘攣。上氣喘滿。小便秘澀。心熱煩

悶。偏身浮腫。腳弱緩縱。不能行步。

半夏

湯洗七次

黃耆

去蘆

甘草

炙

當歸

去蘆

人參

去蘆

厚朴

薑製

獨活

去蘆

橘皮

去白各一兩

熟地黄

芍藥

枳實

去殼炒

麻黃

去節各二兩

桂心

兩三

右咬咀。每服八錢。水一大盞。半薑七片。棗三枚。
煎一大盞。去滓。空心溫服。日三夜一。

醫燈續焰卷九

終

醫燈續焰

卷九

三五

陸地舟